




棉签拭子采样

采样步骤指南

需要帮忙吗？

如果您对这个测试试剂盒有任何疑问或对试剂盒有任何问题，请立刻告知工作人员。

1



请摘下您的口罩。
往您的嘴里看，找到喉咙后面的扁桃体。
您可以用镜子来帮您。
您的扁桃体或扁桃体原本的地方(如果已经被切除)即是您要用棉签拭子采样的地方。

2




轻轻地在纸巾里擤鼻涕
将用过的纸巾扔到提供的医疗废弃物垃圾箱里。
这样您可以丢弃多余的鼻涕。

3




使用免洗消毒洗手液洗手。
这样就不会污染到测试试剂盒。

4



检查面前的密封包装里是否有棉签拭子。
找到拭子上软绵的棉签一端。

5



打开包装，轻轻取出棉签拭子。
拭子将用于在扁桃体和鼻子采样。


重要事项：请勿让有棉签的那一端碰到您的舌头、牙齿、脸颊、牙龈或任何其他表面。

如果棉签碰到这些地方，这根拭子则无法使用，您需要一根新的棉签拭子。如果发生这种情况，请寻求工作人员的协助。

重要事项：棉签拭子采样时可能会觉得不舒服。如果有强烈的抗拒感或感到疼痛，则请勿将拭子推入更深的地方。


如果棉签拭子样本上有血或呕吐物，请立刻告知工作人员。

6



将棉签夹在手指之间，嘴尽量张大，然后在两个扁桃体上(或扁桃体原本的地方)用有棉签的那一端采样。通过用力的接触每一面4次来采样(可以用镜子来帮您)。
小心地从喉咙后面取出棉签。

7



将同一根棉签轻轻地放入一个鼻孔内，直到您感到稍微的阻力(大约到您鼻子里面2.5厘米或1英寸)。
用力将棉签绕着鼻孔采样，整整10圈，然后慢慢将其取出。

重要事项：采样完成后，将棉签直直地拿在手里，不要放下棉签，并通知一位测试助理。

小心不要让棉签碰到任何表面。

戴上您的口罩。

按照工作人员的指示进行下一步。

上交您的样本后，请用免洗消毒洗手液洗手。